

ラクナ梗塞 クリニカルパス

患者氏名 殿

【有症時指示】
・発熱時 (38.5℃以上) : カロナール200mg 2錠
・痙攣時 : ホリゾン10mg静注+Drコール
・嘔気時 : プリンペラン1A静注
・不眠時 : 既往薬 or ルネスタ2錠
・疼痛時 : ロキソニン1錠
・便秘時 : プルゼニド2錠

医師 \_\_\_\_\_
看護師 \_\_\_\_\_ PT \_\_\_\_\_
薬剤師 \_\_\_\_\_ OT \_\_\_\_\_
管理栄養士 \_\_\_\_\_ ST \_\_\_\_\_

【適応基準】
・原則的にすべてのラクナ梗塞の症例
・入院時、責任病変のはっきりしている症例
・入院時、強くラクナ梗塞と判断できる症例

【除外基準】
・重篤な合併症のある症例
・重度の認知症のある症例

Table with 12 columns (Day) and 10 rows (Patient Status, Knowledge Education, Life Activities, Assessment, Treatment, Internal Medicine, Examination, Temperature, Rest, Food, Excretion, Cleanliness, Rehabilitation, Other, Variance, Remarks). Includes detailed medical notes, medication schedules, and assessment criteria.