

頸動脈ステント留置術 治療計画表

患者
穿刺部：☐ 橈骨から ☐ 上腕から ☐ 大腿から

医師
看護師

薬剤師
管理栄養士

理学療法士
パス開始日 /

日付	外来 /	前日 /	当日		術後1日目 /	術後2日目 /	術後3日目 /
目標	治療の必要性を理解でき、 不安なこと、分からないことは質問する事ができる				活動制限を守ることができる 頭痛、しびれなどの症状があれば知らせることができる		食事をしっかり摂取できる 退院後の生活に不安がない
点滴		腎機能障害がある場合 には点滴をします	腎機能障害がない場合は 治療1時間前に点滴を開始します	点滴があります 		点滴があります	お食事が食べられない場合は、点滴があります
内服	内服中のお薬を 確認します 	医師の指示により 服薬してください 		お薬はありません	お薬が再開されます		
処置		身長・体重を測ります  治療の予定時刻は ____時 ____分頃 の予定です	病衣に着替えます アクセサリ類は外してください	酸素が投与されます 心電図モニターを装着します	創の処置があります 心電図モニターをはずします	このような症状があればお知らせ下さい 頭痛、しびれ、麻痺 	
			橈骨から ・手首に麻酔薬のテープを貼ります ・治療前に排尿をすませます	・手首のバンドは、装着後2時間おきに3回緩めます ・止血できているか確認し、止血できていなければ、再度バンドを装着する場合があります ・帰宅8時間後バンドを除去します			
			上腕から ・前腕に印をつけます ・治療前に排尿をすませます	・添え板をして包帯固定します	・回診後に添え板を除去します		
			大腿から ・足の甲とくるぶしに印をつけます ・排尿のための管を入れます	・装具を用いて固定します ・寝返りはできませんが、座ったり立ったりはできません	・帰宅後6時間経過後、固定装具を除去します		
検査	採血、心電図、胸のレントゲンなどの検査があります				頭のMRI、頸部エコー、脳血流を調べる検査があります		
					採血します 		
検温		1日に2回体温や 血圧を測ります 	朝と治療前に測ります	術後6時間までは1時間毎に 測り、その後は適宜伺います	回診後6時間毎に測ります	1日に3回測ります 	1日に2回測ります 
安静度	制限はありません			ベッド上で過ごします	検査後病棟内は自由です	病棟内は自由です	制限はありません
清潔		シャワー浴ができます 			お体を拭きます	シャワー浴ができます 	
排泄		トイレで排泄できます	大腿より治療する方は 尿の管が入ります	ベッド上での排泄となります	医師確認後尿の管を抜きます 検査後、トイレで排泄できます	トイレで排泄できます	
食事		指示されたお食事です ※可能な範囲でご希望に 添います	お昼から食事はできません	帰宅後より 水分が摂取できます	朝から食事は再開します 		
リハビリ		必要な時はリハビリがあります	リハビリはありません		必要に応じてリハビリが開始されます		
その他	医師より治療の説明があります	看護師より入院生活について 説明があります		医師より手術結果の 説明があります	医師より検査結果の 説明があります	医師より今後について説明があります 退院後の生活について説明があります	