



命を救う。命をつなぐ。  
CHIKAMORI  
HEALTHCARE GROUP  
近森病院

# 近森病院からの ホットライン

2021.5 Vol.207

発行：近森病院地域医療連携センター



**皮膚科 科長**  
たかだ ともや  
**高田 智也**

外来診療が主体ですが、蜂窩織炎、  
薬疹などでは入院治療をおすすめする  
場合もあります。皮膚外科手術は必要  
に応じて形成外科医と連携しながら  
行っています。些細な皮膚トラブルから  
入院加療を要する疾患まで、幅広く  
対応し少しでも地域医療に貢献できる  
よう頑張ってまいります。

今後ともよろしくお願ひいたします。

“ちょっとした皮膚のトラブル”でもお気軽に  
ご相談ください。前日までにお電話いただけないと  
予約が可能です。病歴が長い方は、紹介状をご持  
参いただけすると助かります。



088-822-5231(代)

- 【緊急の紹介受診について】 ⇒ E R救命救急センターへ おつなぎします
- 【翌日以降の紹介予約について】 ⇒ 地域医療連携センターへ おつなぎします
- 【共同機器利用の予約について】 ⇒ 近森病院画像診断部へ おつなぎします

\*混雑状況によりお待たせする場合がございます。何卒ご了承ください。

かかりつけ医の先生方へ  
地域医療連携センターより  
皮膚科 医師のご紹介

こんにちは

## 腋窩多汗症

にも力を  
入れています！

### 経歴

2002年 高知医科大学卒業（千葉県出身）  
2002年 同 皮膚科入局  
2004年 幡多けんみん病院  
2006年 高知大学  
2008年 幡多けんみん病院  
2009年 高知大学  
2015年 近森病院着任

### 専門分野

皮膚科一般、抗がん剤による皮膚障害

### 専門資格

日本皮膚科学会 皮膚科専門医

### 趣味

ウォーキング

こんにちは。近森病院皮膚科の高田智也と申します。  
千葉県出身ですが、2歳の頃から高知に住んでいます。

2015年4月より近森病院に  
赴任しました。

当初は一人体制でしたが、  
2020年9月から、小林亜里紗  
医師が入職し、現在は二人体制  
で診療を行っております。



皮膚科全般を勉強中です。  
まだ若輩者ではあります  
が、日々患者さん  
お役に立てるよう勉強して  
おります！

### 主な疾患)

### 【湿疹・皮膚炎群】

あせも(汗疹)、かぶれ(接触皮膚炎)やアトピー性皮膚炎など、かゆい  
ツブツブが主な症状となる皮膚病の総称で、当科外来で最も患者数の多い  
病態です。当科では外用の指導もおろそかにせず、有効な使用方法から  
注意すべき副作用まで、分かりやすい説明を心がけています。

### 【皮膚細菌感染症】

- ・表在性皮膚細菌感染症  
顔にきび(ざ瘡)、とびひ
- ・深在性皮膚細菌感染症  
蜂窩織炎(ほうかしきえん)

### 【ウィルス感染症】

- ・ヘルペスウィルスによるもの  
単純疱疹、帯状疱疹
- ・ヘルペス以外のウィルスによるもの  
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)

### 皮膚科へのご紹介は…

	月	火	水	木	金
午前	高田	高田	高田	高田	高田
午後	高田			高田	

詳細は当科の  
ホームページへ



# 腋窩 多汗症

症状によっては  
治療を受けられます  
健康保険で

きて

今年も高知の熱い夏が近づいて参りました。

夏は皮膚科の患者さんが最も多い季節であり、紫外線や汗など様々な原因で皮膚トラブルが起こります。



汗

で生じる皮膚疾患といえば、汗疹と多汗症がありますが、多汗症では手汗が増える掌蹠多汗症と、ワキ汗が増える腋窩多汗症が代表的です。どちらも暑さに関わらず精神的緊張などが誘因となる疾患であり、生活に支障が出るほど大量に出るケースでは、患者さんのQOLを著しく低下させます。

日本人における有病率 5.8 %

約 20 人に 1 人



当科では  
多汗症に対する  
保険診療を行っています

以前より腋窩多汗症に対するボトックス局注を行っておりましたが、最近になりエクロック<sup>®</sup>ゲル(2020年11月26日発売)による外用療法も選択肢となりました。

腋窩多汗症でお困りの患者さんがいましたら当科へのご紹介をよろしくお願ひいたします！




汗腺から発汗させる神経の働きを抑える

## ボトックス局注

原発性腋窩多汗症の中でも重度の方が対象となる治療法です。


溶解したボツリヌストキシン製剤溶液をわきの下の皮下に片側10~14箇所に分けて少しづつ注射。(5~10分程度)



ボツリヌス菌から抽出されたタンパク質製剤を用いて、交感神経から汗を出す指令(アセチルコリン)の放出を阻害する。



発汗の指令を  
ブロックする塗り薬  
**エクロック<sup>®</sup>ゲル**



日本で初めて健康保険の適用が認められた原発性腋窩多汗症用の塗り薬です。

1日1回  
両脇全体に塗布する。

エクリン汗腺が交換神経から伝えられる汗を出す指令を受け取れないようにブロックする。

