

化学療法計画書

ID					
氏名					
生年 月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m ²)	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	悪性リンパ腫
治療法	リツキサン単独療法

	1
抗癌剤・商品名	リツキサン
規格	100mg 500mg
一般名	リツキシマブ
一日投与量(規定)	375mg/m ²
患者情報から算出した 一日投与量	562.92 mg
実際の投与量	510 mg
	339.7 mg/m²
投与日	day1
1クール期間	7日間
予定クール数	
検査スケジュール	原則的に投与日に化学療法施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施

適応基準	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
推奨 経口剤	○このレジメンは最小度催吐性リスク群です。静注、経口関わらず制吐剤は不要です。
禁忌	1.本剤の成分又はマウスタンパク質由来製品に対する重篤な過敏症又はアナフィラキシーの既往歴のある患者
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm ³ 未満、血小板数:50,000/mm ³ 未満 骨髓機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●リツキサン</p> <p>重大 1.infusion reaction 2.腫瘍崩壊症候群 3.B型肝炎ウイルスによる劇症肝炎、肝炎の増悪 4.肝機能障害、黄疸 5.皮膚粘膜症状 6.汎血球減少、白血球減少、好中球減少、無顆粒球症、血小板減少 7.感染症 8.進行性多巣性白質脳症(PML) 9.間質性肺炎 10.心障害 11.腎障害 12.消化管穿孔・閉塞 13.血圧下降 14.可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状</p> <p>その他 結膜炎、血圧上昇、湿疹、発熱、呼吸困難、尿酸値上昇、皮脂欠乏性湿疹、頭痛、そう痒、口腔咽頭不快感、CRP 上昇、GPT上昇、好酸球増多</p>
備考	

リツキサン単独療法 観察記録

所要時間:

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬()	入外()
医師	指示医師: リツキサン (mg) 一般名(リツキシマブ)		<b style="color: red;">抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与開始時間
投与指示	本体	側管		
	カロナール錠(200mg) 2錠		内服	
	生食20mL+ポララミン 1A		静注(リツキサン開始30分前)	
	生食100mL		ルートキープ	
	生食500mL+リツキサン (1mg/mLとなるように調製)		※下記参照	
本体終了後抜去				

