

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年 月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	60	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.62

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	悪性神経膠腫
治療法	テモダール・アバスチン併用療法(RT併用期)

	1	2
抗癌剤・商品名	テモダール	アバスチン
規格	20mg 100mg	100mg/4mL 400mg/16mL
一般名	テモゾロミド	ベバシズマブ
一日投与量(規定)	75 mg/m <sup>2</sup>	10 mg/kg
患者情報から算出した 一日投与量	<b>121.65 mg</b>	<b>600 mg</b>
実際の投与量	<b>120 mg</b>	<b>500 mg</b>
	<b>74 mg/m<sup>2</sup></b>	<b>8.3 mg/kg</b>
投与日	day1~42	day1,15,29,42
1クール期間	6週間	
予定クール数	1	
検査スケジュール	原則的に投与前にアバスチンセット 検査データに応じて臨時に検査実施	

適応基準	初発悪性神経膠腫
推奨 経口剤	○このレジメンは中等度催吐性リスク群です。以下の経口制吐剤を推奨します ナゼアOD錠0.1mg(連日服用:5日間ごとに処方。テモダール服用30分前に服用。)
禁忌	1. 本剤の成分またはダカルバジンに対し過敏症の既往歴のある患者 2. 喀血(2.5mL以上の鮮血の喀出)の既往のある患者 3. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
中止基準	○投与経過途中の好中球数:1500/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数:100,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (テモダール添付文書内の投与基準に準拠) ○蛋白尿4+⇒蛋白尿1+に回復するまでは投与延期 (CTCAE Ver3.0におけるgrade3の蛋白尿に準拠)
副作用	<p>●アバスチン</p> <p><b>重大</b> 1.ショック、アナフィラキシー 2.消化管穿孔 3.瘻孔 4.創傷治癒遅延 5.出血 6.血栓塞栓症 7.高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 8.可逆性後白質脳症候群 9.ネフローゼ症候群 10.骨髄抑制 11.感染症 12.うっ血性心不全 13.間質性肺炎 14.血栓性微血管症</p> <p><b>その他</b>(5%以上のみ抜粋) 神経毒性、食欲減退、悪心、口内炎、下痢、嘔吐、便秘、胃腸障害、尿蛋白陽性、肝機能異常、高血圧、上室性頻脈、脱毛症、発疹、皮膚変色、剥脱性皮膚炎、関節痛、肺高血圧症、眼障害、疲労・倦怠感、発熱、蜂巣炎、鼻中隔穿孔、卵巣機能不全、骨盤痛</p> <p>●テモダール</p> <p><b>重大</b> 1.骨髄機能抑制 2.ニューモシスチス肺炎、感染症 3.間質性肺炎 4.脳出血 5.アナフィラキシー 6.肝機能障害、黄疸 7.中毒性表皮壊死融解症(TEN)、皮膚粘膜眼症候群(SJS)</p> <p><b>その他</b> 倦怠感、疲労、頭痛、貧血、GOT、GPT、Al-P上昇、悪心、嘔吐、食欲不振、便秘、下痢</p>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>放射線療法の終了が延期された場合、テモダールは最大49日間まで延長できる</li> <li>放射線療法を中止した場合はテモダールおよびアバスチンの投与も中止する</li> <li>放射線療法を終了した翌日からテモダールおよびアバスチンは4週間休薬する</li> </ul>

悪性神経膠腫 テモダール+アバスチン併用療法(RT併用期) 観察記録

所要時間:

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)



施行日		1クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )	
医師	<b>指示医師:</b> <b>アバスチン</b> (                    mg ) 一般名(ペバシズマブ) <b>テモダール</b> (                    mg:経口) 一般名(テモゾロミド)			<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由		抗がん剤以外の 薬剤の変更・追加
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与 開始時間	調剤	実施
投与 指示	本体	側管				
	生食100mL		初回 120分かけて点滴【50mL/h】			
			2回目 90分かけて点滴【67mL/h】			
	生食100mL+アバスチン		3回目以降 60分かけて点滴【100mL/h】			
初回 90分かけて点滴【     mL/h】						
2回目 60分かけて点滴【     mL/h】						
本体終了後抜去		3回目以降 30分かけて点滴【     mL/h】				