

化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m ²)	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	肝細胞癌
治療法	テセントリク+アバスチン併用療法

	1	2
抗癌剤・商品名	テセントリク	アバスチン
規格	1200mg/20mL	400mg/16mL 100mg/4mL
一般名	アテゾリズマブ	ベバシズマブ
一日投与量(規定)	1200mg/body	15mg/kg
患者情報から算出した一日投与量	1200 mg	750 mg
実際の投与量	1200 mg	750 mg
		15 mg/kg
投与日	day1	
1クール期間	21日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日にICI施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施	

適応基準	全身療法歴のないChild-Pugh分類Aの切除不能な肝細胞癌患者
推奨経口剤	〇このレジメンは最小度催吐性リスク群です。静注、経口問わず制吐剤は不要です。
禁忌	1.本剤の成分対し過敏症の既往歴のある患者 2.咯血(2.5mL以上の鮮血の咯出)の既往のある患者
中止基準	投与前の好中球数:1500/mm ³ 未満、血小板数:75,000/mm ³ 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (IMbrave 150試験の投与基準に準拠)
副作用	<p>●テセントリク</p> <p>重大 1.間質性肺疾患 2.肝機能障害、肝炎 3.大腸炎、重度の下痢 4.肺炎 5.1型糖尿病 6.甲状腺機能障害 7.副腎機能障害 8.下垂体機能障害 9.脳炎、髄膜炎 10.神経障害 11.重症筋無力症 12.重度の皮膚障害 13.腎機能障害 14.筋炎、横紋筋融解症 15.Infusion reaction 16.発熱性好中球減少症</p> <p>その他 (5%以上) 下痢、悪心、食欲減退、便秘、発疹、そう痒症、関節痛、貧血、疲労、無力症、発熱、頭痛、味覚異常、不眠症、浮動性めまい、錯感覚、嘔吐、口内炎、腹痛、口内乾燥、咳嗽、呼吸困難、気道感染、鼻出血、鼻炎、皮膚乾燥、脱毛症、斑状丘疹状皮疹、紅斑、筋骨格痛、筋肉痛、血小板減少、好中球減少、白血球減少、リンパ球減少、低ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低カリウム血症、脱水、低アルブミン血症、体重減少、倦怠感、浮腫、インフルエンザ様疾患、粘膜の炎症、悪寒、過敏症</p> <p>●アバスチン</p> <p>重大 1.シヨック、アナフィラキシー 2.消化管穿孔 3.瘻孔 4.創傷治癒遅延:創し開・術後出血 5.出血 6.血栓塞栓症 7.高血圧性脳症 8.可逆性後白質脳症症候群 9.ネフローゼ症候群 10.骨髄抑制 11.感染症 12.うっ血性心不全 13.間質性肺炎 14.血栓性微小血管症</p> <p>その他 神経毒性、食欲減退、悪心、口内炎、下痢、嘔吐、便秘、胃腸障害、尿蛋白陽性、肝機能異常、高血圧、上室性頻脈、脱毛症、発疹、皮膚変色、剥脱性皮膚炎、関節痛、肺高血圧症、眼障害、疲労・倦怠感、発熱、蜂巣炎、鼻中隔穿孔、卵巣機能不全、骨盤痛</p>
備考	<p>次の患者への適応に関しては慎重に判断すること</p> <ul style="list-style-type: none"> ●治療開始前6か月以内に食道静脈瘤あるいは胃静脈瘤からの出血が見られた患者 ●出血を伴うあるいはそのリスクが高い食道静脈瘤もしくは胃静脈瘤に対する十分な治療が行われていない患者 →治療開始6か月以内にEGDが施行され、食道静脈瘤および胃静脈瘤の評価が行われていることが望ましい ●肝臓に対する局所療法後28日が経過していない患者

テセントリク+アバスチン併用療法 観察記録

所要時間: 初回3時間、2回目2時間
3回目以降6時間

氏名: ID() 年齢: (才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬()	入外()			
医師	指示医師:		抗癌剤用量 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の薬剤の変更・追加			
	テセントリク (mg) 一般名(アテゾリズマブ) アバスチン (mg) 一般名(ベバシズマブ)						
投与指示	本体	側管					
	生食250mL		<input type="checkbox"/> 初回 3時間かけて点滴【83mL/h】 <input type="checkbox"/> 2回目 2時間かけて点滴【125mL/h】 <input type="checkbox"/> 3回目以降 90分かけて点滴【167mL/h】				
	生食250mL+テセントリク ※Total 250mLに調製		<input type="checkbox"/> 初回 60分かけて点滴【250mL/h】 <input type="checkbox"/> 2回目以降 30分かけて点滴【500mL/h】 ※フィルター付き点滴ラインを使用				
	生食100mL+アバスチン		<input type="checkbox"/> 初回 90分かけて点滴【 67 mL/h】 <input type="checkbox"/> 2回目 60分かけて点滴【 100 mL/h】 <input type="checkbox"/> 3回目以降 30分かけて点滴 200 mL/h				
本体終了後抜去							
バイタル	項目	投与前	テセントリク 投与中	アバスチン 投与中	投与後	●穿刺部位 末梢(右手 左手 その他:) CVポート(逆血 有り 無し) ●穿刺針 末梢留置針 (20G 22G 24G) CVポート穿刺針22G (16mm 19mm 25mm)	サイン
	体温						
	脈拍						
	血圧	/	/	/	/		
観察	SpO ₂					看護記録	サイン
	呼吸困難						
	紅斑・発疹						
	悪寒						
	疼痛						
	嘔気						
嘔吐							

アクシデント
(過敏反応、不整脈、血管外漏出等)

お薬手帳



※身長160cm 体重50kg 体表面積1.5㎡の患者さんの場合の
1日治療に掛かる抗がん剤薬価(day1のみ)
○テセントリク:637,152円 アバスチン:272,586円