

# 化学療法計画書

ID					
氏名					
生年月日					
実施部署			発行日		
身長 (cm)	160	体重 (kg)	50	体表面積 (m <sup>2</sup> )	1.50

指示医師:			
指導医師:			
投与開始予定日:	年	月	日
投与終了日:	年	月	日

病名	腎細胞癌
治療法	キイトルーダ+レンビマ併用療法

	1	2
抗癌剤・商品名	キイトルーダ	レンビマカプセル
規格	100mg/4mL	4mg 10mg
一般名	ペムブロリズマブ	レンバチニブ
一日投与量(規定)	200mg/body	20mg/day
患者情報から算出した 一日投与量	<b>200 mg</b>	レンビマ減量時の用量設定
		減量段階
		通常
		1日投与量
実際の投与量	<b>200 mg</b>	<b>20 mg</b>
投与日	day1	day1-21
1クール期間	21日間	
予定クール数		
検査スケジュール	原則的に投与日にICI施行前セット 検査データに応じて臨時に検査実施	

適応基準	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
推奨 経口剤	○このレジメンは最小度催吐性リスク群です。静注、経口問わず制吐剤は不要です。
禁忌	1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.妊婦又は妊娠している可能性のある女性
中止基準	投与前の好中球数:1000/mm <sup>3</sup> 未満、血小板数:50,000/mm <sup>3</sup> 未満 骨髄機能が回復するまでは投与延期 (CTCAE ver4.0 における Grade3 の血液毒性に準拠)
副作用	<p>●キイトルーダ</p> <p><b>重大</b> 1.間質性肺炎 2.大腸炎、小腸炎、重度の下痢 3.中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑 4.類天疱瘡 5.神経障害 6.劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎 7.甲状腺機能障害 8.下垂体機能障害 9.副腎機能障害 10.1型糖尿病 11.腎障害 12.膵炎 13.筋炎、横紋筋融解症 14.重症筋無力症 15.心筋炎 16.脳炎、髄膜炎 17.重篤な血液障害 18.重度の胃炎 19.ぶどう膜炎 20.血球貪食症候群 21.結核 22.Infusion reaction</p> <p><b>その他</b> (10%以上)好中球減少、貧血、血小板減少、悪心、下痢、嘔吐、疲労、無力症、食欲減退、そう痒症、発疹、脱毛症 (1~10%未満)白血球減少、リンパ球減少、発熱性好中球減少症、血中TSH増加、眼乾燥、流涙増加、口内炎、便秘、口内乾燥、腹痛、消化不良、上腹部痛、胃食道逆流性疾患、発熱、粘膜の炎症、倦怠感、末梢性浮腫、悪寒、インフルエンザ様疾患、肺炎、低マグネシウム血症、低カリウム血症、低ナトリウム血症、リパーゼ増加、脱水、高血糖、アミラーゼ増加、低リン酸血症、関節痛、筋肉痛、四肢痛、背部痛、筋痙縮、味覚異常、頭痛、末梢性感覚ニューロパシー、浮動性めまい、錯感覚、不眠症、蛋白尿、血中クレアチニン増加、発声障害、呼吸困難、咳嗽、鼻出血、手掌・足底発赤知覚不全症候群、斑状丘疹状皮疹、皮膚乾燥、尋常性白斑、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、高血圧、ほてり、体重減少</p> <p>●レンビマ</p> <p><b>重大</b> 1.高血圧 2.出血 3.動脈血栓塞栓症 4.静脈血栓塞栓症 5.肝障害 6.急性胆嚢炎 7.腎障害 8.消化管穿孔、瘻孔形成、気胸 9.可逆性後白質脳症症候群 10.心障害 11.手足症候群 12.感染症 13.骨髄抑制 14.低カルシウム血症 15.創傷治癒遅延 16.間質性肺炎 17.甲状腺機能低下</p> <p><b>その他</b> (30%以上)下痢、疲労、食欲減退 (10~30%未満)悪心、口内炎、嘔吐、腹痛、無力症、発声障害、頭痛、味覚異常、関節痛、筋肉痛、発疹、体重減少</p>
備考	

# キイトルーダ+レンビマ併用療法 観察記録

所要時間: 30分

氏名: ID( ) 年齢: ( 才)

施行日	クール	回目	施行前内服薬( )	入外( )	
医師	<b>指示医師:</b> <b>キイトルーダ(                    mg )</b> 一般名(ペムプロリズマブ)		<b>抗癌剤用量</b> 計画書設定量 計画書設定量より減量 計画書設定量より増量 減量・増量理由	抗がん剤以外の 薬剤の変更・追加	
	<input type="checkbox"/> 投与決定 <input type="checkbox"/> 未決定 <input type="checkbox"/> 延期・中止			投与 開始時間	調剤
投与指示	本体	側管			
	生食100mL		ルートキープ		
		生食100mL+キイトルーダ	30分かけて点滴【200mL/hr】 ※ <b>フィルター付き</b> 点滴ラインを使用		
本体終了後抜去					